

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領(1998年9月)に準拠して作成

鎮痛・抗炎症・解熱剤

日本薬局方 ロキソプロフェンナトリウム錠

ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」

Loxoprofen Sodium Tablets 60mg「KUNIHIRO」

剤形	素錠
規格・含量	1錠中 ロキソプロフェンナトリウム水和物(日局) 68.1mg (無水物として 60 mg) 含有
一般名	和名：ロキソプロフェンナトリウム水和物 洋名：Loxoprofen Sodium Hydrate
製造販売承認年月日 薬価基準収載・発売年月日	製造販売承認年月日：2011年1月28日(販売名変更による) 薬価基準収載年月日：2011年11月28日(販売名変更による) 発売年月日：2003年9月1日
製造・販売会社名	皇漢堂製薬株式会社
担当者の連絡先・ 電話番号・FAX番号	TEL： FAX：

本IFは2016年3月改訂(第14版)の添付文書の記載に基づき改訂した。

I F 利用の手引きの概要 - 日本病院薬剤師会 -

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者（以下、MRと略す）等にインタビューし、当該医薬品の評価を行うのに必要な医薬品情報源として使われていたインタビューフォームを、昭和63年日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第2小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、I Fと略す）として位置付けを明確化し、その記載様式を策定した。そして、平成10年日病薬学術第3小委員会によって新たな位置付けとI F記載要領が策定された。

2. I Fとは

I Fは「医療用医薬品添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な医薬品の適正使用や評価のための情報あるいは薬剤情報提供の裏付けとなる情報等が集約された総合的な医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。しかし、薬事法の規制や製薬企業の機密等に関わる情報、製薬企業の製剤意図に反した情報及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等はI Fの記載事項とはならない。

3. I Fの様式・作成・発行

規格はA4判、横書きとし、原則として9ポイント以上の字体で記載し、印刷は一色刷りとする。表紙の記載項目は統一し、原則として製剤の投与経路別に作成する。I Fは日病薬が策定した「I F記載要領」に従って記載するが、本I F記載要領は、平成11年1月以降に承認された新医薬品から適用となり、既発売品については「I F記載要領」による作成・提供が強制されるものではない。また、再審査及び再評価（臨床試験実施による）がなされた時点ならびに適応症の拡大等がなされ、記載内容が大きく異なる場合にはI Fが改訂・発行される。

4. I Fの利用にあたって

I F策定の原点を踏まえ、MRへのインタビュー、自己調査のデータを加えてI Fの内容を充実させ、I Fの利用性を高めておく必要がある。

MRへのインタビューで調査・補足する項目として、開発の経緯、製剤的特徴、薬理作用、臨床成績、非臨床試験等の項目が挙げられる。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、当該医薬品の製薬企業の協力のもと、医療用医薬品添付文書、お知らせ文書、緊急安全性情報、Drug Safety Update（医薬品安全対策情報）等により薬剤師等自らが加筆、整備する。そのための参考として、表紙の下段にI F作成の基となった添付文書の作成又は改訂年月を記載している。なお適正使用や安全確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等には承認外の用法・用量、効能・効果が記載されている場合があり、その取扱いには慎重を要する。


目次

．概要に関する項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	．安全性（使用上の注意等）に関する項目・・・・・・・・・・ 11
1．開発の経緯	1．警告内容とその理由
2．製品の特徴及び有用性	2．禁忌内容とその理由
．名称に関する項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	3．効能・効果に関連する使用上の注意とその理由
1．販売名	4．用法・用量に関連する使用上の注意とその理由
2．一般名	5．慎重投与内容とその理由
3．構造式又は示性式	6．重要な基本的注意とその理由及び処置方法
4．分子式及び分子量	7．相互作用
5．化学名（命名法）	8．副作用
6．慣用名、別名、略号、記号番号	9．高齢者への投与
7．CAS登録番号	10．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
．有効成分に関する項目・・・・・・・・・・・・・・・・ 2	11．小児等への投与
1．有効成分の規制区分	12．臨床検査結果に及ぼす影響
2．物理化学的性質	13．過量投与
3．有効成分の各種条件下における安定性	14．適用上及び薬剤交付時の注意 （患者等に留意すべき必須事項等）
4．有効成分の確認試験法	15．その他の注意
5．有効成分の定量法	16．その他
．製剤に関する項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3	．非臨床試験に関する項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1．剤形	1．一般薬理
2．製剤の組成	2．毒性
3．製剤の各種条件下における安定性	．取扱い上の注意等に関する項目・・・・・・・・・・ 16
4．溶出性	1．有効期間又は使用期限
5．製剤中の有効成分の確認試験法	2．貯法・保存条件
6．製剤中の有効成分の定量法	3．薬剤取扱い上の注意点
7．容器の材質	4．承認条件
8．その他	5．包装
．治療に関する項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6	6．同一成分・同効薬
1．効能又は効果	7．国際誕生年月日
2．用法及び用量	8．製造販売承認年月日及び承認番号
3．臨床成績	9．薬価基準収載年月日
．薬効薬理に関する項目・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	10．効能・効果追加、用法・用量変更追加等の 年月日及びその内容
1．薬理的に関連のある化合物又は化合物群	11．再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容
2．薬理作用	12．再審査期間
．薬物動態に関する項目・・・・・・・・・・・・・・・・ 8	13．長期投与の可否
1．血中濃度の推移、測定法	14．厚生労働省薬価基準収載医薬品コード
2．薬物速度論的パラメータ	15．保険給付上の注意
3．吸収	．文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
4．分布	1．引用文献
5．代謝	2．その他の参考文献
6．排泄	3．文献請求先
7．透析等による除去率	．参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
	1．主な外国での発売状況
	．備考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
	1．その他の関連資料

. 概要に関する項目	
------------	--

- | | |
|---------------|---|
| 1. 開発の経緯 | ロキソプロフェンナトリウム水和物は三共(株)が開発した鎮痛・抗炎症・解熱剤である。ロキソプロフェンナトリウム水和物を含有するロキソプロフェンナトリウム錠「クニヒロ」60mg は、2003年7月に薬価基準に記載された。その後、2011年1月に医療事故防止のため販売名をロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 「クニヒロ」に名称変更した。 |
| 2. 製品の特徴及び有用性 | ・本剤は、既存のロキソプロフェンナトリウム水和物製剤と、効能・効果及び用法・用量は同一である。
・本剤は、用量調節可能な割線入りの素錠である。 |

. 名称に関する項目	
------------	--

- | | |
|----------------------|--|
| 1. 販売名
(1)和名 | ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 「クニヒロ」 |
| (2)洋名 | Loxoprofen Sodium Tablets 60mg 「KUNIHIRO」 |
| (3)名称の由来 | 特になし |
| 2. 一般名
(1)和名(命名法) | ロキソプロフェンナトリウム水和物 (JAN) |
| (2)洋名(命名法) | Loxoprofen Sodium Hydrate (JAN)
Loxoprofen (INN) |
| 3. 構造式又は示性式 |  |
| 4. 分子式及び分子量 | 分子式：C ₁₅ H ₁₇ NaO ₃ · 2H ₂ O
分子量：304.31 |
| 5. 化学名(命名法) | Monosodium 2-{4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl} propanoate dihydrate |
| 6. 慣用名、別名、略号、記号番号 | 特になし |
| 7. CAS登録番号 | Loxoprofen Sodium : 80382 23 6
Loxoprofen : 68767 14 6 |




. 有効成分に関する項目	
--------------	--

1. 有効成分の規制区分	なし
2. 物理化学的性質	
(1) 外観・性状	白色～帯黄白色の結晶又は結晶性の粉末である。
(2) 溶解性	水又はメタノールに極めて溶けやすく、エタノール(95)に溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。
(3) 吸湿性	該当資料なし
(4) 融点(分解点)、 沸点、凝固点	融点 : 約 197 (分解)
(5) 酸塩基解離定数	該当資料なし
(6) 分配係数	該当資料なし
(7) その他の主な 示性値	旋光度 : 本品の水溶液 (1 : 20) は旋光性を示さない。 吸光度 : 224 nm 付近に吸収極大を示す。224 nm における分子吸光係数 () は、約 9200 である。 pH : 本品 1.0 g を新たに煮沸して冷却した水 20 mL に溶かした液の pH は 6.5 ~ 8.5 である。
3. 有効成分の各種条件下 における安定性	該当資料なし
4. 有効成分の確認試験法	(1) 紫外可視吸光度測定法による吸収スペクトルの確認 (2) 赤外吸収スペクトル測定法 (KBr 錠剤法) による吸収スペクトルの確認 (3) ナトリウム塩の定性反応
5. 有効成分の定量法	液体クロマトグラフィー

．製剤に関する項目

1．剤形

(1) 剤形の区別及び
性状

販売名	ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「クニヒロ」			
色調・性状	片面に割線の入った、ごくうすい紅色の素錠で、においはなく、わずかに特異な収れん性の味がある。			
外形 サイズ	表	裏	側面	直径 : 9.0 mm 厚さ : 3.2 mm 重量 : 250 mg
				

(2) 製剤の物性

硬度 : 4 kgf 以上

崩壊試験: 日局「崩壊試験法」(1)錠剤の項により試験を行うとき、これに適合する。(崩壊時間 15 分以内)

(3) 識別コード

KSK103

2．製剤の組成

(1) 有効成分(活性成分)の含量

1 錠中にロキソプロフェンナトリウム水和物(日局) 68.1 mg (無水物として 60 mg) を含有する。

(2) 添加物

乳糖水和物、結晶セルロース、ポビドン、部分アルファー化デンプン、クロスポビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、三二酸化鉄

3．製剤の各種条件下における安定性

・PTP 包装品の安定性

PTP 包装品は加速条件下で 6 ヶ月間安定であり、室温で 3 年間安定であると推定された。¹⁾

	試験条件	保存形態	試験項目	結果
加速試験	40 75%RH 6 ヶ月	PTP	・性状 ・確認試験 ・溶出性 ・含量	いずれの試験項目とも規格に適合し、安定であった。

・無包装状態での安定性

各種条件下で、安定であると推定された。

試験条件	保存形態	試験項目	結果
温度[40、3 ヶ月(遮光・気密容器)] 湿度[25 / 75%RH、3 ヶ月(遮光・開放)] 光 [1,000lux、総照射量 60 万 lux・hr]	無包装	・外観 ・硬度 ・溶出性 ・含量	いずれの試験項目とも規格に適合し、安定であった。

4. 溶出性

(1) 公的溶出試験への適合性

ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「クニヒロ」は、日本薬局方医薬品各条に定められたロキソプロフェンナトリウム錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

【溶出規格】

試験液：水、30分、50rpm、85%以上溶出

(2) 本品と同種比較品の溶出挙動

【試験条件】

・試験方法：日局「溶出試験法」第2法（パドル法）

・試験液：水、pH1.2、pH6.8


・回転数：50 rpm

・試験製剤：ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「クニヒロ」


同種比較品（ロキソプロフェンナトリウム水和物として 68.1 mg、無水物として 60 mg 含有）

ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「クニヒロ」は、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について」（平成13年5月31日付医薬審発第786号）の判定基準に適合し、同種比較品と溶出挙動は同等であった。²⁾


試験液：水



試験液：pH 1.2



試験液：pH 6.8



5. 製剤中の有効成分の確認試験法

- (1) m ジニトロベンゼン試液による呈色反応
- (2) 紫外可視吸光度測定法
- (3) 薄層クロマトグラフィー

6. 製剤中の有効成分の定量法

液体クロマトグラフィー

7. 容器の材質

PTP: ポリ塩化ビニルフィルム / アルミニウム箔
 バラ: ポリエチレン

8. その他

特になし

．治療に関する項目

<p>1．効能又は効果</p> <p>(1)承認を受けた効能又は効果</p> <p>(2)効能又は効果に関連する使用上の注意</p> <p>2．用法及び用量</p> <p>(1)承認を受けた用法及び用量</p> <p>(2)用法及び用量に関連する使用上の注意</p> <p>3．臨床成績</p> <p>(1)臨床効果</p> <p>(2)臨床薬理試験 ：忍容性試験</p> <p>(3)探索的試験 ：用量反応探索試験</p> <p>(4)検証的試験</p> <p>1)無作為化平行用量反応試験</p> <p>2)比較試験</p> <p>3)安全性試験</p> <p>4)患者・病態別試験</p> <p>(5)治療の使用</p> <p>1)使用成績調査・特別調査・市販後臨床試験</p> <p>2)承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要</p>	<p>下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、歯痛 手術後、外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎 下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)</p> <p>該当しない</p> <p>効能又は効果 〃 の場合 通常、成人にロキソプロフェンナトリウム(無水物として)1回60mg、1日3回経口投与する。頓用の場合は、1回60～120mgを経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。</p> <p>効能又は効果 〃 の場合 通常、成人にロキソプロフェンナトリウム(無水物として)1回60mgを頓用する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、原則として1日2回までとし、1日最大180mgを限度とする。また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。</p> <p>該当しない</p> <p>該当資料なし</p> <p>該当資料なし</p> <p>該当資料なし</p> <p>該当資料なし</p> <p>該当資料なし</p> <p>該当資料なし</p> <p>該当資料なし</p> <p>該当資料なし</p> <p>該当資料なし</p> <p>該当資料なし</p> <p>該当資料なし</p>
---	--

. 薬効薬理に関する項目	
--------------	--

1. 薬理的に関連のある化合物又は化合物群	酸性非ステロイド抗炎症薬(プロピオン酸系) イブプロフェン、ケトプロフェン、フルルビプロフェン、フルルビプロフェンアキセチル、オキサプロジン、チアプロフェン酸、ナプロキセン、ブラノプロフェン、アルミノプロフェン、ザルトプロフェン など
2. 薬理作用 (1)作用部位・作用機序	<p>ロキソプロフェンナトリウム水和物はプロドラッグであり、活性代謝物のトランスOH体が下記のような酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)としての作用を示す。プロドラッグであることに起因して、胃腸障害が少なく作用が長時間であるという特色を有する。</p> <p>NSAIDsは、炎症のケミカルメディエーターであるプロスタグランジン(PG)の生合成を阻害することによって抗炎症作用を現す。PGは細胞膜の構成脂質であるアラキドン酸から生合成され、その律速酵素はシクロオキシゲナーゼ(COX)であるが、NSAIDsのPG生合成阻害機序はこのCOXの阻害である。</p> <p>NSAIDsは抗炎症作用以外に、解熱及び鎮痛作用を現すが、これらの作用もPG生合成阻害に起因する共通のものと考えられる。即ち、細菌感染や各種の刺激により組織や細胞が損傷を受けると、内因性の発熱物質が遊離され、それらが体温調節中枢を刺激することによりPGの産生が促され、PGは体温調節中枢の設定温度を上昇させる。これが発熱の機序であるが、NSAIDsはこの過程におけるPGの産生を抑制することによって設定温度を正常に戻す。即ち解熱効果を発揮する。また、組織の損傷が起こると発痛物質であるブラジキニンが産生され、同時に産生されたPGはこのブラジキニンの発痛作用を増強すると考えられる。従って、NSAIDsによりPGの産生が阻害されれば、鎮痛効果が得られることになる。³⁾</p>
(2)薬効を裏付ける試験成績	該当資料なし

. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移、測定法

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 最高血中濃度到達時間

0.6 時間後⁴⁾ (健康成人男性、1 錠 1 回経口投与時)

(3) 血中濃度と生物学的同等性試験


1) 生物学的同等性試験

ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 「クニヒロ」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠 (ロキソプロフェンナトリウム (無水物として) 60 mg) を健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、Cmax) について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。⁴⁾

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0-6hr} ($\mu\text{g}\cdot\text{hr}/\text{mL}$)	Cmax ($\mu\text{g}/\text{mL}$)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 「クニヒロ」	8.7 ± 1.2	4.9 ± 1.3	0.6 ± 0.3	1.5 ± 0.3
標準製剤 (錠剤、60mg)	8.6 ± 1.1	4.5 ± 1.1	0.7 ± 0.3	1.4 ± 0.2

(Mean ± S.D., n = 10)

($\mu\text{g}/\text{mL}$)



血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(4) 中毒症状を発現する血中濃度

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ	
(1) 吸収速度定数	該当資料なし
(2) バイオアベイラビリティ	1 (3) 「血中濃度と生物学的同等性試験」の項 (p.8) 参照
(3) 消失速度定数	Kel= 0.47 hr ⁻¹ 4) (健康成人男性、1 錠 1 回経口投与時: 1 (3) 「血中濃度と生物学的同等性試験」の項 (p.8) 参照)
(4) クリアランス	該当資料なし
(5) 分布容積	該当資料なし
(6) 血漿蛋白結合率	該当資料なし
3. 吸収	該当資料なし
4. 分布	
(1) 血液 - 脳関門通過性	該当資料なし
(2) 胎児への移行性	該当資料なし
(3) 乳汁中への移行性	該当資料なし
(4) 髄液への移行性	該当資料なし
(5) その他の組織への移行性	該当資料なし
5. 代謝	
(1) 代謝部位及び代謝経路	該当資料なし
(2) 代謝に関与する酵素 (CYP450 等) の分子種	該当資料なし
(3) 初回通過効果の有無及びその割合	該当資料なし
(4) 代謝物の活性の有無及び比率	該当資料なし
(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ	該当資料なし

6. 排泄	
(1) 排泄部位	該当資料なし
(2) 排泄率	該当資料なし
(3) 排泄速度	該当資料なし
7. 透析等による除去率	
(1) 腹膜透析	該当資料なし
(2) 血液透析	該当資料なし
(3) 直接血液還流	該当資料なし

. 安全性（使用上の注意等）に関する項目	
----------------------	--

1. 警告内容とその理由	該当しない
2. 禁忌内容とその理由	<p>禁忌（次の患者には投与しないこと）</p> <ol style="list-style-type: none"> 消化性潰瘍のある患者 [プロスタグランジン生合成抑制により、胃の血流量が減少し消化性潰瘍が悪化することがある。] (ただし、 5 「慎重投与内容とその理由」の項(p.11)参照) 重篤な血液の異常のある患者 [血小板機能障害を起こし、悪化するおそれがある。] 重篤な肝障害のある患者 [副作用として肝障害が報告されており、悪化するおそれがある。] 重篤な腎障害のある患者 [急性腎不全、ネフローゼ症候群等の副作用を発現することがある。] 重篤な心機能不全のある患者 [腎のプロスタグランジン生合成抑制により 浮腫、循環体液量の増加が起こり、心臓の仕事量が増加するため症状を悪化させるおそれがある。] 本剤の成分に過敏症の既往歴のある患者 アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作の誘発)又はその既往歴のある患者 [アスピリン喘息発作を誘発することがある。] 妊娠末期の婦人 [10 「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項(p14)参照]
3. 効能・効果に関連する使用上の注意とその理由	該当しない
4. 用法・用量に関連する使用上の注意とその理由	該当しない
5. 慎重投与内容とその理由	<p>慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)</p> <ol style="list-style-type: none"> 消化性潰瘍の既往歴のある患者 [潰瘍を再発させることがある。] 非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期投与による消化性潰瘍のある患者で、本剤の長期投与が必要であり、かつミソプロストールによる治療が行われている患者 [ミソプロストールは非ステロイド性消炎鎮痛剤により生じた消化性潰瘍を効能・効果としているが、ミソプロストールによる治療に抵抗性を示す消化性潰瘍もあるので、本剤を継続投与する場合には、十分経過を観察し、慎重に投与すること。] 血液の異常又はその既往歴のある患者 [溶血性貧血等の副作用がおこりやすくなる。] 肝障害又はその既往歴のある患者 [肝障害を悪化又は再発させることがある。] 腎障害又はその既往歴のある患者 [浮腫、蛋白尿、血清クレアチニン上昇、高カリウム血症等の副作用がおこることがある。] 心機能異常のある患者 [2 「禁忌内容とその理由」(p.11)の項参照] 過敏症の既往歴のある患者 気管支喘息の患者 [病態を悪化させることがある。] 潰瘍性大腸炎の患者 [病態を悪化させることがある] クローン病の患者 [病態を悪化させることがある。] 高齢者 [9 「高齢者への投与」の項 (p.14)参照]

6. 重要な基本的注意と
その理由及び処置方法

重要な基本的注意

- (1) 消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留意すること。
- (2) 慢性疾患（関節リウマチ、変形性関節症）に対し本剤を用いる場合には、次の事項を考慮すること。
 - 1) 長期投与する場合には定期的に臨床検査（尿検査、血液検査及び肝機能検査等）を行うこと。また、異常が認められた場合には減量、休薬等の適切な措置を講ずること。
 - 2) 薬物療法以外の療法も考慮すること。
- (3) 急性疾患に対し本剤を用いる場合には、次の事項を考慮すること。
 - 1) 急性炎症、疼痛及び発熱の程度を考慮し、投与すること。
 - 2) 原則として同一の薬剤の長期投与を避けること。
 - 3) 原因療法があればこれを行い、本剤を漫然と投与しないこと。
- (4) 患者の状態を十分観察し、副作用の発現に留意すること。過度の体温下降、虚脱、四肢冷却等があらわれることがあるので、特に高熱を伴う高齢者又は消耗性疾患を合併している患者においては、投与後の患者の状態に十分注意すること。
- (5) 感染症を不顕性化するおそれがあるので、感染による炎症に対して用いる場合には適切な抗菌剤を併用し、観察を十分行い慎重に投与すること。
- (6) 他の消炎鎮痛剤との併用は避けることが望ましい。
- (7) 高齢者には副作用の発現に特に注意し、必要最小限の使用にとどめるなど慎重に投与すること。

7. 相互作用

(1) 併用禁忌とその理由

該当しない

(2) 併用注意とその理由

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン	その抗凝血作用を増強するおそれがあるので注意し、必要があれば減量すること。	本剤のプロスタグランジン生合成抑制作用により血小板凝集が抑制され血液凝固能が低下し、その薬剤の抗凝血作用に相加されるためと考えられている。
スルホニル尿素系血糖降下剤 トルブタミド等	その血糖降下作用を増強するおそれがあるので注意し、必要があれば減量すること。	本剤のヒトでの蛋白結合率は、ロキソプロフェンで 97.0%、trans OH 体で 92.8%と高く、蛋白結合率の高い薬剤と併用すると血中に活性型の併用薬が増加し、その薬剤の作用が増強されるためと考えられている。
ニューキノロン系抗菌剤 エノキサシン水和物等	その痙攣誘発作用を増強することがある。	ニューキノロン系抗菌剤は、中枢神経系の抑制性神経伝達物質である GABA の受容体への結合を阻害し、痙攣誘発作用をおこす。本剤の併用によりその阻害作用を増強するためと考えられている。
メトトレキサート	血中メトトレキサート濃度を上昇させ、その作用を増強することがあるので、必要があれば減量すること。	機序は不明であるが、本剤の腎におけるプロスタグランジン生合成抑制作用により、これらの薬剤の腎排泄が減少し血中濃度が上昇するためと考えられている。
リチウム製剤 炭酸リチウム	血中リチウム濃度を上昇させ、リチウム中毒を起こすことがあるので血中のリチウム濃度に注意し、必要があれば減量すること。	
チアジド系利尿薬 ヒドロフルメチアジド ヒドロクロチアジド等	その利尿・降圧作用を減弱するおそれがある。	本剤の腎におけるプロスタグランジン生合成抑制作用により、水、ナトリウムの排泄を減少させるためと考えられている。
降圧剤 ACE 阻害剤 アンジオテンシン受容体拮抗剤等	その降圧作用を減弱するおそれがある。 腎機能を悪化させるおそれがある。	本剤のプロスタグランジンの生合成抑制作用により、これらの薬剤の降圧作用を減弱させる可能性がある。 本剤のプロスタグランジンの生合成抑制作用により、腎血流量が低下するためと考えられる。

8. 副作用

(1) 副作用の概要

1) 重大な副作用と
初期症状

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

- 1) **ショック、アナフィラキシー様症状**：ショック、アナフィラキシー様症状(血圧低下、蕁麻疹、喉頭浮腫、呼吸困難等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) **無顆粒球症、溶血性貧血、白血球減少、血小板減少**：無顆粒球症、溶血性貧血、白血球減少、血小板減少があらわれることがあるので、血液検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 3) **中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)**：中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 4) **急性腎不全、ネフローゼ症候群、間質性腎炎**：急性腎不全、ネフローゼ症候群、間質性腎炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、急性腎不全に伴い高カリウム血症があらわれることがあるので、特に注意すること。
- 5) **うっ血性心不全**：うっ血性心不全があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 6) **間質性肺炎**：発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多等を伴う間質性肺炎があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には直ちに投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 7) **消化管出血**：重篤な消化性潰瘍又は小腸、大腸からの吐血、下血、血便等の消化管出血が出現し、それに伴うショックがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、これらの症状が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 8) **消化管穿孔**：消化管穿孔があらわれることがあるので、心窩部痛、腹痛等の症状が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 9) **小腸・大腸の狭窄・閉塞**：小腸・大腸の潰瘍に伴い、狭窄・閉塞があらわれることがあるので、観察を十分に行い、悪心・嘔吐、腹痛、腹部膨満等の症状が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 10) **肝機能障害、黄疸**：肝機能障害(黄疸、AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、 γ -GTP 上昇等)、劇症肝炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には中止するなど適切な処置を行うこと。
- 11) **喘息発作**：喘息発作等の急性呼吸障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、本剤の投与を直ちに中止し、適切な処置を行うこと。
- 12) **無菌性髄膜炎**：無菌性髄膜炎(発熱、頭痛、悪心・嘔吐、項部硬直、意識混濁等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。(特にSLE又はMCTDの患者に発現しやすい。)
- 13) **横紋筋融解症**：横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。

(類薬) 再生不良性貧血：他の非ステロイド性消炎鎮痛剤で、再生不良性貧血があらわれるとの報告がある。

2) その他の副作用

	頻度不明
過 敏 症 ^{注)}	発疹、そう痒感、蕁麻疹、発熱
消 化 器	腹痛、胃部不快感、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、消化性潰瘍 ^{注)} 、便秘、胸やけ、口内炎、消化不良、口渇、腹部膨満、小腸・大腸の潰瘍 ^{注)}
循 環 器	動悸、血圧上昇
精 神 神 経 系	眠気、頭痛、しびれ、めまい
血 液	貧血、白血球減少、好酸球増多、血小板減少
肝 臓	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、ALP 上昇
泌 尿 器	血尿、蛋白尿、排尿困難
そ の 他	浮腫、顔面熱感、胸痛、倦怠感

注) 投与を中止すること

(3)項目別副作用発現率及び臨床検査値異常一覧	該当資料なし
(3)基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度	該当資料なし
(4)薬物アレルギーに対する注意及び試験法	<p>【禁忌】 本剤の成分に過敏症の既往歴のある患者</p> <p>【慎重投与】 過敏症の既往歴のある患者</p> <p>【重大な副作用】</p> <p>1)ショック、アナフィラキシー様症状：ショック、アナフィラキシー様症状(血圧低下、蕁麻疹、喉頭浮腫、呼吸困難等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>3)皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症：皮膚粘膜眼症候群(Stevens Johnson 症候群)、中毒性表皮壊死症(Lyell 症候群)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>【その他の副作用】</p> <p>過敏症(発疹、そう痒感、蕁麻疹、発熱)</p> <p>投与を中止すること。</p>
9. 高齢者への投与	高齢者では、副作用があらわれやすいので、少量から開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること(6 「重要な基本的注意とその理由及び処置方法」の項(p.12)参照)。
10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	<p>(1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合のみ投与すること [妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]。</p> <p>(2)妊娠末期の婦人には投与しないこと [動物実験(ラット)で分娩遅延が報告されている。]。</p> <p>(3)妊娠末期のラットに投与した実験で、胎児の動脈管収縮が報告されている。</p> <p>(4)授乳中の婦人に投与することを避け、やむをえず投与する場合には授乳を中止させること [動物実験(ラット)で乳汁中への移行が報告されている。]。</p>
11. 小児等への投与	低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。
12. 臨床検査結果に及ぼす影響	該当資料なし
13. 過量投与	該当資料なし
14. 適用上及び薬剤交付時の注意(患者等に留意すべき必須事項等)	薬剤交付時：PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。(PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)
15. その他の注意	非ステロイド性消炎鎮痛剤を長期間投与されている女性において、一時的な不妊が認められたとの報告がある。
16. その他	特になし

. 非臨床試験に関する項目	
---------------	--

1. 一般薬理	該当資料なし
2. 毒性	
(1) 単回投与毒性試験	該当資料なし
(2) 反復投与毒性試験	該当資料なし
(3) 生殖発生毒性試験	該当資料なし
(4) その他の特殊毒性	該当資料なし

. 取扱い上の注意等に関する項目	
------------------	--

1. 有効期間又は使用期限	使用期限 : 製造後 3 年	
2. 貯法・保存条件	室温保存	
3. 薬剤取扱い上の注意点	<table border="1"> <tr> <td> <p style="text-align: center;">【取扱い上の注意】</p> <p>ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「クニヒロ」は、錠剤表面に使用色素による赤い斑点がみられることがある。</p> </td> </tr> </table>	<p style="text-align: center;">【取扱い上の注意】</p> <p>ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「クニヒロ」は、錠剤表面に使用色素による赤い斑点がみられることがある。</p>
<p style="text-align: center;">【取扱い上の注意】</p> <p>ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「クニヒロ」は、錠剤表面に使用色素による赤い斑点がみられることがある。</p>		
4. 承認条件	特になし	
5. 包装	PTP :100 錠 (PTP:10 錠×10)、1000 錠 (PTP:10 錠×100) バラ :1000 錠(缶)	
6. 同一成分・同効薬	(同一成分薬) ロキソニン錠 60mg(三共)など (同効薬) 非ステロイド性消炎鎮痛剤	
7. 国際誕生年月日	不明	
8. 製造販売承認年月日及び承認番号	製造販売承認年月日 : 2011 年 1 月 28 日 承認番号 : 22300AMX00456000	
9. 薬価基準収載年月日	2011 年 11 月 28 日	
10. 効能・効果追加、用法・用量変更追加等の年月日及びその内容	製造販売承認事項一部変更承認 : 2005 年 12 月 22 日 内容 : 効能又は効果 (歯痛) の追加	
11. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	該当しない	
12. 再審査期間	該当しない	
13. 長期投与の可否	厚生労働省告示第 99 号 (平成 14 年 3 月 18 日付) において、本剤の投薬期間に上限は設けられている医薬品には該当しない。	
14. 厚生労働省薬価基準収載医薬品コード	1149019F1579 (統一名収載コード 1149019F1013)	
15. 保険給付上の注意	特になし	

. 文献

- | | |
|---------|--|
| 1. 引用文献 | 1) 皇漢堂製薬株式会社 社内資料
2) 皇漢堂製薬株式会社 社内資料
3) 第15改正日本薬局方解説書, 廣川書店, 東京, 2006, C-4793, C-1390 ~ 1391
4) 皇漢堂製薬株式会社 社内資料 |
|---------|--|

2. その他の参考文献	特になし
-------------	------

3. 文献請求先	引用文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。
----------	-------------------------------

皇漢堂製薬株式会社 学術担当 〒660-0803 兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号 TEL:0120 023706 FAX:06 6482 7492 受付時間 平日 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日を除く)

. 参考資料

1. 主な外国での発売状況	なし
---------------	----

. 備考

1. その他の関連資料	特になし
-------------	------

製造販売元

皇漢堂製薬株式会社

兵庫県尼崎市長洲本通 2 丁目 8 番 27 号