




## 先発品との比較表

	後発品	先発品
商品名	メロキシカム錠 10mg「クニヒロ」	標準製剤
製造販売会社	皇漢堂製薬株式会社	
成分・含量	1錠中「メロキシカム」10mg含有	
薬効分類	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	
薬価	23.30円/錠	52.60円/錠
薬価差	29.30円/錠	
効能・効果	下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群	
用法・用量	通常、成人にはメロキシカムとして10mgを1日1回食後に経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日最高用量は15mgとする。 【用法・用量に関連する使用上の注意】 国内において1日15mgを超える用量での安全性は確立していない。[使用経験が少ない。]	
添加物	クエン酸ナトリウム水和物、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸	クエン酸ナトリウム水和物、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ステアリン酸マグネシウム
規制区分・貯法・使用期限	劇薬 室温保存，吸湿注意，3年	劇薬 室温保存，吸湿注意
外観	淡黄色の割線入り素錠	淡黄色の割線入り素錠
外形(長径・厚さ・重量)	 8.0mm    2.8mm    180mg	約8mm    約2.8mm    約180mg
識別コード	KSK113	
薬物動態(先発品との同等性)	<p>溶出試験 「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき両剤の溶出挙動は同等であると判断された。</p> <p>溶出曲線 (pH6.8, 50rpm)</p> 	<p>血中濃度比較試験 両剤の血中での薬物動態は同等であるとして厚生労働省から承認されている。</p> 
備考		
担当者、連絡先		