ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

AI230214

第３類医薬品

ウルソデオキシコール酸配合

エルビタンE

ビタミンEは、末梢血管の血液循環を促進する働きがあり、血行を良くし、末梢血行障害によって起こる様々な症状を緩和します。

エルビタンEは、ビタミンEとしての効力が最も高い天然ビタミンE（d－α－トコフェロール）を主成分とし、ビタミンEの吸収を高めるウルソデオキシコール酸が配合されています。さらにビタミンB_1誘導体、イノシトールヘキサニコチン酸エステル、ビタミンB_6、ガンマーオリザノール、ビタミンB_2酪酸エステルの５種類を配合した製品です。

⚠［使用上の注意］

相談すること

１．次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
（1）医師の治療を受けている人。
（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

２．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症　　状
皮　　膚	発疹・発赤、かゆみ
消　化　器	胃部不快感

３．服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
便秘、下痢

４．１ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

５．服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

［効能・効果］

○末梢血行障害による次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
○更年期における次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
○月経不順
「ただし、これらの症状について、１ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談してください。」
○次の場合のビタミンEの補給：老年期

（裏面もお読みください）

［成分］ １日量（３カプセル）中

d－α－トコフェロール（ビタミンE）…… 300mg
フルスルチアミン塩酸塩（ビタミンB_1誘導体）…… 25mg
（フルスルチアミンとして……22.9mg）
イノシトールヘキサニコチン酸エステル …… 150mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB_6）…… 50mg
ガンマーオリザノール …… 10mg
ウルソデオキシコール酸 …… 12mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB_2酪酸エステル）…… 12mg
添加物として、ポリソルベート80、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、グリセリン、D－ソルビトール、酸化チタン、赤色１０２号、黄色５号、青色１号を含有します。

＜成分に関連する注意＞
本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB_2酪酸エステル）によるものですので心配ありません。

［用法・用量］

次の１回量を食後に水またはお湯でかまずに服用してください。

年　　齢	１ 回 量	１日服用回数
成人（15歳以上）	１カプセル	３　回
15歳未満の小児	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞
定められた用法・用量を厳守してください。

［保管および取扱上の注意］

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
（4）箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、製品をこの文書とともに箱に入れたまま保管してください。
（5）一度開封した後は、品質保持の点から６ヵ月以内に服用してください。なお使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
（6）カプセルの取り出し方
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

〈ＰＴＰシートの取り出し図〉



本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。
お客様相談窓口　フリーダイヤル　0120－023520
受付時間　平日９：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話　０１２０－１４９－９３１（フリーダイヤル）

兵庫県尼崎市長洲本通２丁目８番27号
皇漢堂製薬株式会社

（22. 2. 改訂）