

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2019年7月

皇漢堂製薬株式会社

精神安定剤

向精神薬、処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 エチゾラム錠

エチゾラム錠 0.25mg/0.5mg/1mg 「クニヒロ」

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

入眠剤

向精神薬、習慣性医薬品^{注1)}、処方箋医薬品^{注2)}

日本薬局方 ソルピデム酒石酸塩錠

ソルピデム酒石酸塩錠 5mg/10mg 「クニヒロ」

注 1) 注意－習慣性あり

注 2) 注意－医師等の処方箋により使用すること

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。今後のご使用に際しましては、下記の点にご留意くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容】

エチゾラム錠 0.25mg/0.5mg/1mg 「クニヒロ」

改訂後（下線部:改訂箇所）	改訂前（該当箇所のみ）
【禁忌(次の患者には投与しないこと)】 1. 急性 閉塞 隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により 眼圧が上昇し 、症状を悪化させる こと がある。〕 2. （省略）	【禁忌(次の患者には投与しないこと)】 1. 急性狭隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により、症状を悪化させるおそれがある。〕 2. （省略）

ソルピデム酒石酸塩錠 5mg/10mg 「クニヒロ」

改訂後（下線部:改訂箇所）	改訂前（該当箇所のみ）
【禁忌(次の患者には投与しないこと)】 1. ～ 3. （省略） 4. 急性 閉塞 隅角緑内障の患者〔眼圧が上昇し、症状を悪化させるおそれがある。〕	【禁忌(次の患者には投与しないこと)】 1. ～ 3. （省略） 4. 急性狭隅角緑内障の患者〔眼圧が上昇し、症状を悪化させるおそれがある。〕

【改訂理由】

（ 部分） 通知による改訂

本改訂につきましてはD S U No.281 への掲載を予定しています。