

医薬品を正しく購入していただくための 説 明 文 書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	リポスミン
2	成分・分量	2錠中 ジフェンヒドラミン塩酸塩 …………… 50mg
3	用法・用量	寝つきが悪い時や眠りが浅い時、成人（15歳以上） 1回2錠1日1回就寝前に服用してください。
4	効能・効果	一時的な不眠の次の症状の緩和：寝つきが悪い、眠りが浅い
5	健康衛生上の 危害を防止する ために必要な 事項	<ol style="list-style-type: none">次の人は服用しないでください。<ol style="list-style-type: none">妊婦または妊娠していると思われる人。15歳未満の小児。日常的に不眠の人。不眠症の診断を受けた人。本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。服用前後は飲酒しないでください。寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ、連用しないでください。過量服用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 <ul style="list-style-type: none">医師の治療を受けている人。高齢者。薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。次の症状のある人。 排尿困難次の診断を受けた人。 緑内障、前立腺肥大
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断する 事項	翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じることがあります。 販売は1人1包装まで

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。