

ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。



第3類医薬品

便秘薬

酸化マグネシウム錠「クニヒロ」

酸化マグネシウムが腸内に水分を集め、
便を柔らかくして膨らませ、お通じを促します。
腸を直接刺激しない非刺激性の便秘薬で、
お腹が痛くなりにくくクセになりにくい便秘薬です。



⚠️【使用上の注意】

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）

相談すること 🗣️

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐のある人。
(5) 腎臓病の診断を受けた人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
精神神経系	強い眠気、意識がうすれる
循 環 器	立ちくらみ、脈が遅くなる
呼 吸 器	息苦しい
そ の 他	筋力の低下、口のかわき

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

(裏面もお読みください)

[効能・効果]

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

[用法・用量]

次の量を就寝前(または空腹時)に水またはお湯でかまずに服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量してください。


年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人 (15歳以上)	3～6錠	1 回
11歳以上15歳未満	2～4錠	
7歳以上11歳未満	2～3錠	
5歳以上7歳未満	1～2錠	
5歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 効果発現までの時間に個人差があります。
- (4) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

〈PTPシートの取り出し図〉



[成分]

1日量(6錠)中

酸化マグネシウム 2000mg

添加物として、セルロース、クロスカルメロースナトリウム、アセスルファムカリウム、ステアリン酸カルシウムを含有します。

[保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさげ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社

(25.11.作成)